

CONCEPTO

Rectosigmoidoscopia: Es un examen que consiste en la visualización del borde anal, canal anal, recto y sigmoide distal, para lo cual el médico utiliza un equipo flexible delgado que en su punta tiene un lente que transmite la imagen a un monitor o televisor.

PREPARACIÓN PARA RECTOSIGMOIDOSCOPIA**Tener disponibles los siguientes medicamentos**

- 2 Sobre de polietilenglicol (nutilelly o clean prep/clearovac).
- 2 Enema Rectales TRAVAD 133 ml.
- 1 Pastilla de plasil solo si presenta vómitos (opcional)

El día anterior al examen

- Alimentación con dieta líquida 12 horas antes del examen (jugos claros, agua panela, tisana, aguas aromáticas, gelatina de color claro (piña, naranja mandarina), crema de verduras, caldo de pollo sin papa (consomé).
- No tomar bebidas oscuras: (café, malta, chocolate).
- No ingerir lácteos.
- Tomar el sobre de preparación.

Forma de preparación y administración del polietilenglicol (nutilelly o clean prep/clearovac)

- Disolver el contenido de cada sobre de polietilenglicol (nutilelly/clean prep/clearovac) en 1 litro de agua.
- Agite enérgicamente, utilizando preferiblemente un envase cerrado (con tapa).
- Tomar un vaso de solución preparada cada 15 a 20 minutos (mantenga refrigerada la mezcla), e iniciar 24 horas antes del examen.
- Debe tomar toda la preparación, ya que garantiza una buena limpieza del colon.
- Durante ese tiempo no puede ingerir alimentos sólidos, únicamente puede beber líquidos.
- Se debe colocar el primer enema TRAVAD 133 ml rectal, el día anterior al examen a las 8:00 pm

El día del examen

- Se debe colocar el segundo enema 3 horas antes del examen.
- Asistir en ayuno total 8 horas antes del examen
- Si toma medicamentos para la presión tomar solo con un sorbo de agua a las 6:00 am

Recomendaciones para el día del procedimiento

- Debe tener disponibilidad de tiempo.
- Asistir con acompañante.
- Presentar orden médica y autorización
- Traer consentimientos informados correctamente diligenciados y firmados.
- Si es diabético: no tomar hipoglucemiantes orales 12 horas antes del examen y el día del examen NO aplicarse insulina.
- Uñas sin esmalte.
- Si el paciente toma medicamentos de forma permanente seguir las recomendaciones del médico.
- Si toma medicamentos anticoagulantes suspender 5 días antes del examen

**PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE A
TELEFONOS DE CONTACTO PARA CITAS Y CONSULTAR INQUIETUDES
CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**

7:30 am a 4:00 pm.

Teléfono fijo 4850115 ext. 135 de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

procedimientosmenores@cnruu.com.co

CLINICA DESA

Teléfono fijo 3865910 ext. 322